


Exercice 1 :

1. On donne les fonctions u et v définies par $u(x) = -x^2 - 2x + 8$ et $v(x) = \sqrt{x}$.
 - (a) Déterminer l'ensemble de définition de u et de v .
 - (b) Justifier l'ensemble de définition de $v \circ u$ puis déterminer l'expression de $f(x) = v \circ u(x)$.
 - (c) Déterminer l'ensemble de dérivabilité de f puis calculer $f'(x)$.
 - (d) En déduire le tableau de variation de f sur son ensemble de définition.
2. On considère la fonction g définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 5e^{x^3-9x}$.
 - (a) Calculer $g'(x)$.
 - (b) En déduire les variations de g sur $\mathbb{R}$.

Exercice 2 :


On considère une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et deux fois dérivable. On donne ci-dessous la courbe représentative de la fonction f'' , dérivée seconde de la fonction f , dans un repère orthonormé. Les points suivants appartiennent à la courbe : $A(-2; 0)$; $B(0; -6)$ et $C(3; 0)$.




Courbe représentative de la fonction f''

Dans tout cet exercice, chaque réponse sera justifiée à partir d'arguments graphiques.

1. La courbe représentative de f admet-elle des points d'inflexion ?
2. Sur $[-2; 3]$, la fonction f est-elle convexe ? Est-elle concave ?
3. Parmi les deux courbes données ci-après, une seule est la représentation graphique de la fonction f : laquelle ? Justifier la réponse.



(a) Courbe 1



(b) Courbe 2

Exercice 3 :

La fonction g est définie sur $[0; +\infty[$ par $g(x) = 1 - e^{-x}$.

On admet que la fonction g est dérivable sur $[0; +\infty[$.

Partie A

1. Étudier les variations de la fonction g sur $[0; +\infty[$ et dresser son tableau de variations.
2. Étudier la convexité de g .

Partie B


Dans cette partie, k désigne un réel strictement positif.

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x - 1)e^{-kx} + 1$.

On admet que la fonction f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et on note f' sa fonction dérivée.

Dans le plan muni d'un repère orthonormé $(O; I, J)$, on note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de la fonction f . Cette courbe est représentée ci-dessous pour une certaine valeur de k .

La tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A d'abscisse 1 coupe l'axe des ordonnées en un point noté B .



1. (a) Démontrer que pour tout réel x , $f'(x) = e^{-kx}(-kx + k + 1)$.
(b) Démontrer que l'ordonnée du point B est égale à $g(k)$ où g est la fonction définie dans la partie A.
2. En utilisant la partie A, démontrer que le point B Appartient au segment $[OJ]$.