

Pour tout entier naturel n , on considère les intégrales suivantes :

$$I_n = \int_0^{\pi} e^{-nx} \sin(x) dx, \quad J_n = \int_0^{\pi} e^{-nx} \cos(x) dx.$$

1. Calculer I_0 .
2. (a) Justifier que, pour tout entier naturel n , on a $I_n \geqslant 0$.
 (b) Montrer que, pour tout entier naturel n , on a $I_{n+1} - I_n \leqslant 0$.
 (c) Déduire des deux questions précédentes que la suite (I_n) converge.
3. (a) Montrer que, pour tout entier naturel n , on a :

$$I_n \leqslant \int_0^{\pi} e^{-nx} dx.$$

- (b) Montrer que, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, on a :

$$\int_0^{\pi} e^{-nx} dx = \frac{1 - e^{-n\pi}}{n}.$$

- (c) Déduire des deux questions précédentes la limite de la suite (I_n) .
4. (a) En intégrant par parties l'intégrale I_n de deux façons différentes, établir les deux relations suivantes, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$:

$$I_n = 1 + e^{-n\pi} - nJ_n \quad \text{et} \quad I_n = \frac{1}{n}J_n$$

- (b) En déduire que, pour tout entier naturel $n \geqslant 1$, on a

$$I_n = \frac{1 + e^{-n\pi}}{n^2 + 1}$$

5. On souhaite obtenir le rang n à partir duquel la suite (I_n) devient inférieure à 0,1.

Recopier et compléter la cinquième ligne du script Python ci-dessous avec la commande appropriée.

```

1 from math import *
2 def seuil():
3     n = 0
4     l = 2
5     ...
6     n=n+1
7     l=(1+exp(-n*pi))/(n*n+1)
8 return n
  
```