

L'objectif de cet exercice est de conjecturer en partie A puis de démontrer en partie B le comportement d'une suite.

Les deux parties peuvent cependant être traitées de manière indépendante.

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$u_{n+1} = \frac{4}{5 - u_n}.$$

Partie A

- Recopier et compléter la fonction Python suivante `suite(n)` qui prend comme paramètre le rang n et renvoie la valeur du terme u_n .

```
def suite(n):
    u = ...
    for i in range(n) :
        ...
    return u
```

- L'exécution de `suite(2)` renvoie 1.333333333333333.

Effectuer un calcul pour vérifier et expliquer cet affichage.

- À l'aide des affichages ci-dessous, émettre une conjecture sur le sens de variation et une conjecture sur la convergence de la suite (u_n) .

```
>>> suite(2)
1.333333333333333
>>> suite(5)
1.0058479532163742
>>> suite(10)
1.0000057220349845
>>> suite(20)
1.000000000005457
```

Partie B

On considère la fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $]-\infty ; 5[$ par:

$$f(x) = \frac{4}{5 - x}.$$

Ainsi, la suite (u_n) est définie par $u_0 = 3$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

- Montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle $]-\infty ; 5[$.
- Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n on a :

$$1 \leq u_{n+1} \leq u_n \leq 4.$$

3. (a) Soit x un réel de l'intervalle $]-\infty ; 5[$.

Prouver l'équivalence suivante:

$$f(x) = x \iff x^2 - 5x + 4 = 0.$$

- (b) Résoudre $f(x) = x$ dans l'intervalle $]-\infty ; 5[$.

4. Démontrer que la suite (u_n) est convergente.

Déterminer sa limite.

5. Le comportement de la suite serait-il identique en choisissant comme terme initial $u_0 = 4$ au lieu de $u_0 = 3$?