

Principaux domaines abordés : suites ; fonctions, fonction exponentielle.

On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par

$$f(x) = x^3 e^x.$$

On admet que la fonction f est dérivable sur \mathbb{R} et on note f' sa fonction dérivée.

1. On définit la suite (u_n) par $u_0 = -1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = f(u_n)$.

- (a) Calculer u_1 puis u_2 .

On donnera les valeurs exactes, puis les valeurs approchées à 10^{-3} .

- (b) On considère la fonction `fond`, écrite en langage Python ci-dessous.

On rappelle qu'en langage Python,
`i in range(n)` signifie que
`i` varie de 0 à $n - 1$.

```
def fond(n):
    u = -1
    for i in range(n):
        u=u**3*exp(u)
    return u
```

Déterminer, sans justifier, la valeur renvoyée par `fond(2)` arrondie à 10^{-3} .

2. (a) Démontrer que, pour tout x réel, on a $f'(x) = x^2 e^x(x + 3)$.

- (b) Justifier que le tableau de variations de f sur \mathbb{R} est celui représenté ci-dessous :

	$+\infty$	-3	$+\infty$
f	0	$-27e^{-3}$	$+\infty$

- (c) Démontrer, par récurrence, que pour tout entier naturel n , on a :

$$-1 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq 0.$$

- (d) En déduire que la suite (u_n) est convergente.

- (e) On note ℓ la limite de la suite (u_n) .

On rappelle que ℓ est solution de l'équation $f(x) = x$.

Déterminer ℓ . (Pour cela, on admettra que l'équation $x^2 e^x - 1 = 0$ possède une seule solution dans \mathbb{R} et que celle-ci est strictement supérieure à $\frac{1}{2}$).