

On compte quatre groupes sanguins dans l'espèce humaine: A, B, AB et O.

Chaque groupe sanguin peut présenter un facteur rhésus. Lorsqu'il est présent, on dit que le rhésus est positif, sinon on dit qu'il est négatif.

Au sein de la population française, on sait que:

- 45 % des individus appartiennent au groupe A, et parmi eux 85 % sont de rhésus positif;
- 10 % des individus appartiennent au groupe B, et parmi eux 84 % sont de rhésus positif;
- 3 % des individus appartiennent au groupe AB, et parmi eux 82 % sont de rhésus positif.

On choisit au hasard une personne dans la population française.

On désigne par:

- $A$  l'événement La personne choisie est de groupe sanguin A ;
- $B$  l'événement La personne choisie est de groupe sanguin B ;
- $AB$  l'événement La personne choisie est de groupe sanguin AB ;
- $O$  l'événement La personne choisie est de groupe sanguin O ;
- $R$  l'événement La personne choisie a un facteur rhésus positif .

Pour un événement quelconque  $E$ , on note  $\bar{E}$  l'événement contraire de  $E$  et  $p(E)$  la probabilité de  $E$ .

1. Recopier l'arbre ci-contre en complétant les dix pointillés.

2. Montrer que  $p(B \cap R) = 0,084$ . Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

3. On précise que  $p(R) = 0.839,7$ .

Montrer que  $p_O(R) = 0,83$ .


4. On dit qu'un individu est donneur universel lorsque son sang peut être transfusé à toute personne sans risque d'incompatibilité.

Le groupe O de rhésus négatif est le seul vérifiant cette caractéristique.

Montrer que la probabilité qu'un individu choisi au hasard dans la population française soit donneur universel est de 0.071,4.

1. Lors d'une collecte de sang, on choisit un échantillon de 100 personnes dans la population d'une ville française. Cette population est suffisamment grande pour assimiler ce choix à un tirage avec remise. On note  $X$  la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 100 personnes associe le nombre de donneurs universels dans cet échantillon.

(a) Justifier que  $X$  suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.



- (b) Déterminer à  $10^{-3}$  près la probabilité qu'il y ait au plus 7 donneurs universels dans cet échantillon.
- (c) Montrer que l'espérance  $E(X)$  de la variable aléatoire  $X$  est égale à 7,14 et que sa variance  $V(X)$  est égale à  $6,63 \times 10^{-2}$  près.
2. Lors de la semaine nationale du don du sang, une collecte de sang est organisée dans  $N$  villes françaises choisies au hasard numérotées 1,2,3, ...,  $N$  où  $N$  est un entier naturel non nul.
- On considère la variable aléatoire  $X_1$  qui à chaque échantillon de 100 personnes de la ville 1 associe le nombre de donneurs universels dans cet échantillon.
- On définit de la même manière les variables aléatoires  $X_2$  pour la ville 2, ...,  $X_N$  pour la ville  $N$ .
- On suppose que ces variables aléatoires sont indépendantes et qu'elles admettent la même espérance égale à 7,14 et la même variance égale à 6,63.
- On considère la variable aléatoire  $M_N = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_N}{N}$ .
- (a) Que représente la variable aléatoire  $M_N$  dans le contexte de l'exercice ?
- (b) Calculer l'espérance  $E(M_N)$ .
- (c) On désigne par  $V(M_N)$  la variance de la variable aléatoire  $M_N$ .  
 Montrer que  $V(M_N) = \frac{6,63}{N}$ .
- (d) Déterminer la plus petite valeur de  $N$  pour laquelle l'inégalité de Bienaymé- Tchebychev permet d'affirmer que:

$$P(7 < M_N < 7,28) \geq 0,95.$$