

## Partie A

On considère l'équation différentielle

$$(E_1) : \quad y' + 0,48y = \frac{1}{250},$$

où  $y$  est une fonction de la variable  $t$  appartenant à l'intervalle  $[0 ; +\infty[$ .

1. On considère la fonction constante  $h$  définie sur l'intervalle  $[0 ; +\infty[$  par  $h(t) = \frac{1}{120}$ .  
Montrer que la fonction  $h$  est solution de l'équation différentielle  $(E_1)$ .
2. Donner la forme générale des solutions de l'équation différentielle  $y' + 0,48y = 0$ .
3. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle  $(E_1)$ .

## Partie B

On s'intéresse à présent à l'évolution d'une population de bactéries dans un milieu de culture.

À un instant  $t = 0$ , on introduit une population initiale de 30,000 bactéries dans le milieu. On note  $p(t)$  la quantité de bactéries, exprimée en millier d'individus, présente dans le milieu après un temps  $t$ , exprimé en heure.

On a donc  $p(0) = 30$ .

On admet que la fonction  $p$  définie sur l'intervalle  $[0 ; +\infty[$  est dérivable, strictement positive sur cet intervalle et qu'elle est solution de l'équation différentielle  $(E_2)$  :

$$p' = \frac{1}{250}p \times (120 - p)$$

Soit  $y$  la fonction strictement positive sur l'intervalle  $[0 ; +\infty[$  telle que, pour tout  $t$  appartenant à l'intervalle  $[0 ; +\infty[$ , on a  $p(t) = \frac{1}{y(t)}$ .

1. Montrer que si  $p$  est solution de l'équation différentielle  $(E_2)$ , alors  $y$  est solution de l'équation différentielle  $(E_1)$  :  $y' + 0,48y = \frac{1}{250}$ .
2. On admet réciproquement que, si  $y$  est une solution strictement positive de l'équation différentielle  $(E_1)$ , alors  $p = \frac{1}{y}$  est solution de l'équation différentielle  $(E_2)$ .

Montrer que, pour tout  $t$  appartenant à l'intervalle  $[0 ; +\infty[$ , on a :

$$p(t) = \frac{120}{1 + K e^{-0,48t}} \text{ avec } K \text{ une constante réelle.}$$

3. En utilisant la condition initiale, déterminer la valeur de  $K$ .
4. Déterminer  $\lim_{t \rightarrow +\infty} p(t)$ . En donner une interprétation dans le contexte de l'exercice.
5. Déterminer le temps nécessaire pour que la population de bactéries dépasse 60,000 individus.

*On donnera le résultat sous la forme d'une valeur arrondie exprimée en heures et minutes.*