

Partie A

On considère la fonction f définie sur l'ensemble $]0 ; +\infty[$ par

$$f(x) = 1 + x^2 - 2x^2 \ln(x).$$

On admet que f est dérivable sur l'intervalle et on note f' sa fonction dérivée

1. Justifier que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ et, en remarquant que $f(x) = 1 + x^2(1 - 2 \ln(x))$, justifier que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.
2. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle $]0 ; +\infty[$, $f'(x) = -4x \ln(x)$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$, puis dresser le tableau de variations de la fonction sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$.
4. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[1 ; +\infty[$ et que $\alpha \in [1 ; e]$.

On admet dans la suite de l'exercice, que l'équation $f(x) = 0$ n'admet pas de solution sur l'intervalle $]0 ; 1[$.

5. On donne la fonction ci-dessous écrit en Python. L'instruction `from lycee import *` permet d'accéder à la fonction `ln`.

```
from lycee import *

def f(x) :
    return 1 + x**2 - 2*x**2*ln(x)

def dichotomie(p)
    a=1
    b=2.7
    while b - a > 10**(-p) :
        if f(a)*f((a+b)/2) < 0 :
            | b = (a+b)/2
        else :
            | a = (a+b)/2
    return (a,b)
```

Il écrit dans la console d'exécution :

`>>> dichotomie(1)`

Parmi les quatre propositions ci-dessous, recopier celle affichée par l'instruction précédente ? Justifier votre réponse (on pourra procéder par élimination).

- Proposition A : (1.75, 1.9031250000000002)
 Proposition B : (1.85, 1.9031250000000002)
 Proposition C : (2.75, 2.9031250000000002)
 Proposition D : (2.85, 2.9031250000000002)

Partie B

On considère la fonction g définie sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$, par

$$g(x) = \frac{\ln(x)}{1 + x^2}.$$

On admet que g est dérivable sur l'intervalle $]0 ; +\infty[$ et on note g' sa fonction dérivée.

On note \mathcal{C}_g la courbe représentative de la fonction g dans le plan rapporté à un repère $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

- Démontrer que pour tout réel x de l'intervalle $]0 ; +\infty[$, $g'(x) = \frac{f(x)}{x(1+x^2)^2}$.

- Démontrer que la fonction g admet un maximum en $x = \alpha$

On admet que $g(\alpha) = \frac{1}{2\alpha^2}$.

- On note T_1 la tangente à \mathcal{C}_g au point d'abscisse 1 et on note T_α la tangente à \mathcal{C}_g au point d'abscisse α .

Déterminer, en fonction de α , les coordonnées du point d'intersection des droites T_1 et T_α .