

On considère la fonction f définie sur \mathbb{R} par $f(x) = xe^x$. Alors la fonction dérivée de f , notée f' , est définie sur \mathbb{R} par :

- a. $f'(x) = e^x$ b. $f'(x) = (x + 1)e^x$ c. $f'(x) = e$ d. $f'(x) = x^2e^x$.

EXERCICE 2

5 POINTS

Dans un aéroport, les portiques de sécurité servent à détecter les objets métalliques que pourraient emporter certains voyageurs.

On choisit au hasard un voyageur franchissant un portique. On note :


- S l'évènement le voyageur fait sonner le portique.
- M l'évènement le voyageur porte un objet métallique.

On considère qu'un voyageur sur 500 porte sur lui un objet métallique.

On remarque que :

- Lorsqu'un voyageur franchit le portique avec un objet métallique, la probabilité que le portique sonne est égale à 0,98.
- Lorsqu'un voyageur franchit le portique sans objet métallique, la probabilité que le portique ne sonne pas est aussi égale à 0,98.

1. Recopier et compléter l'arbre de probabilités ci-dessous illustrant cette situation :



2. Montrer que : $p(S) = 0,021,92$.

On suppose qu'à chaque fois qu'un voyageur franchit le portique, la probabilité que ce portique sonne est égale à 0,021,92, et ce de façon indépendante des éventuels déclenchements de sonnerie lors des passages des autres voyageurs.

Deux personnes passent successivement le portique de sécurité. On note X la variable aléatoire donnant le nombre de fois où le portique sonne.

3. (a) Justifier qu'on peut modéliser la loi de X par une loi binomiale $\mathcal{B}(n ; p)$ dont on précisera les paramètres n et p .
 (b) Reprendre et compléter le tableau donnant la loi de X :

k	0	1	2
$p(X = k)$			

(c) Calculer et interpréter l'espérance de X dans le contexte de l'exercice.

EXERCICE 3

5 POINTS

En 2019, les déchets d'une entreprise sont évalués à 6,000 tonnes.
 Cette entreprise s'engage à réduire ses déchets de 5 % chaque année.

1. Avec cette politique, quelle quantité de déchets peut envisager l'entreprise pour l'année 2020 ?
2. Pour tout entier naturel n , on note d_n la quantité de déchets produits en tonne par cette entreprise l'année $2019 + n$.

Avec cette notation, on a alors $d_0 = 6,000$.

- (a) Exprimer d_{n+1} en fonction de d_n pour tout entier naturel n .
- (b) Quelle est la nature de la suite (d_n) ?
- (c) Déterminer la quantité totale de déchets produits par l'entreprise entre 2019 et 2023.
On arrondira le résultat à la tonne près.

3. L'entreprise souhaite savoir au bout de combien d'années d'application de cette politique de réduction des déchets la quantité annuelle produite aura diminué de 40 % par rapport à la quantité produite en 2019.

Recopier et compléter l'algorithme ci-dessous sur la copie afin qu'il permette de répondre à la question posée :

```

    D ← 6,000
    N ← 0
    Tant que D .....
        D ← .....
        N ← N + 1
    Fin Tant que
  
```

EXERCICE 4

5 POINTS


On procède, chez un sportif, à l'injection intramusculaire d'un produit.

Celui-ci se diffuse progressivement dans le sang. On admet que la concentration de ce produit dans le sang (exprimée en mg/L = milligramme par litre) peut être modélisée par la fonction f , définie sur l'intervalle $[0 ; 10]$ par :

$$f(x) = \frac{6x}{e^x}$$

où x est le temps exprimé en heure.

Sa courbe représentative est donnée ci-dessous dans un repère orthonormé du plan.



1. Montrer que pour tout $x \in [0 ; 10]$, la fonction dérivée de f , notée f' , a pour expression :

$$f'(x) = \frac{6 - 6x}{e^x}.$$

2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[0 ; 10]$ puis en déduire le tableau de variations de f sur $[0 ; 10]$.
3. Quelle est la concentration maximale du médicament dans le sang ?
(On donnera la valeur exacte et une valeur approchée à 10^{-1} près).
 Au bout de combien de temps est-elle atteinte ?
4. Ce produit fait l'objet d'une réglementation par la fédération sportive : un sportif est en infraction si, au moment du contrôle, la concentration dans son sang du produit est supérieure à 2 mg/L.
 Le sportif peut-il être contrôlé à tout moment après son injection ?
 Expliquer votre raisonnement en vous basant sur l'étude de la fonction et/ou une lecture graphique sur la courbe \mathcal{C} .